

PH - 795

MITICOÇAN®

benzoato de benzila

USO TÓPICO

USO EXTERNO - NÃO INGERIR

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

APRESENTAÇÕES:

MITICOÇAN® LÍQUIDO: caixa com 1 frasco com 100 ml.**MITICOÇAN® SABONETE:** caixa com 1 sabonete de 80 g.

COMPOSIÇÃO:

Líquido

Cada ml contém:

benzoato de benzila.....0,2 ml

Excipientes: ácido esteárico, trolamina, simeticona e água.**Sabonete**

Cada sabonete contém:

benzoato de

benzila.....8,0 g

Excipientes: massa básica, dióxido de titânio, edetato de sódio, ácido cítrico, essência e tinopal.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE:

- O que é e para que serve MITICOÇAN®?**MITICOÇAN®** é um medicamento à base de benzoato de benzila, utilizado no tratamento de piolhos, lêndeas e da sarna.**- Como MITICOÇAN® deve ser guardado?**Como todo medicamento, **MITICOÇAN®** deve ser guardado em sua embalagem original e conservado em temperatura ambiente (15 e 30°C). Proteger da luz e umidade.

PRAZO DE VALIDADE: vide embalagem externa do produto.

Ao adquirir um medicamento, confira sempre o prazo de validade na embalagem do produto. **NUNCA USE MEDICAMENTO COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO**, pois as substâncias podem estar alteradas e causar prejuízo para a sua saúde. Verifique se o produto está lacrado e em boas condições de armazenamento.**- MITICOÇAN® pode ser utilizado durante a gravidez e amamentação?**

O uso em gestantes e lactantes, principalmente com presença de lesões da pele causadas pela coceira provocada pelos parasitas, deve ser feito sob orientação médica.

- Como MITICOÇAN® deve ser utilizado?**MITICOÇAN® pode ser utilizado no tratamento de piolhos, lêndeas e da sarna por adultos e crianças.****Agite bem antes de usar.****MITICOÇAN® LÍQUIDO:** para crianças até dois anos, aconselha-se a diluição do produto na proporção de 1 parte do produto para 2 partes de água.

Crianças maiores que 2 anos e menores de 12 anos, aconselha-se a diluição de 1 parte do produto para 1 de água. Esta orientação visa a redução do risco de irritação.

Para adultos, não é necessária a diluição. Não é necessário utilizar todo o volume em uma única aplicação.

Adicionalmente, aconselha-se a fazer uma prova de toque em uma pequena área antes de utilizar o produto. Caso ocorra ardência ou vermelhidão, o produto não deverá ser utilizado.

Tratamento de piolhos e lêndeas: após lavar os cabelos, friccionar o produto sobre as regiões afetadas. Aplicar somente o suficiente para umedecer o cabelo. Envolver a cabeça com toalha e deixar agir por aproximadamente 3 minutos. Os piolhos mortos e as lêndeas devem ser retirados com um pente fino.

Se necessário, a aplicação deve ser repetida. Normalmente o tratamento só deve durar dois dias, pois várias aplicações do produto podem passar a ter papel irritante e perpetuador das lesões, ao invés de curativo.

Tratamento da sarna: fazer uma aplicação, de preferência à noite, após o banho (**banhos quentes são contra-indicados**).O produto deve ser aplicado sobre a pele ainda úmida, especialmente nos locais onde a sarna é mais comum (**entre os dedos, axilas, abdômen e nádegas**). Deixar secar, realizar em seguida uma nova aplicação e vestir-se ou deitar-se, sem enxugar o corpo. Na manhã seguinte, tomar novo banho e mudar as roupas do corpo e da cama, que devem ser lavadas e passadas em seguida. Se necessário, o tratamento deve ser repetido após 24 horas, ou a critério médico.**MITICOÇAN® SABONETE:** no tratamento de piolhos: deve-se lavar o local afetado, produzindo uma espuma que deverá permanecer no local por 5 minutos. Os piolhos mortos e as lêndeas devem ser retirados com um pente fino. Se necessário, a aplicação deve ser repetida. No tratamento da sarna: deve-se lavar cuidadosamente a parte afetada com o sabonete, produzindo uma espuma que deverá permanecer na pele até secar.**Se houver outras pessoas com sarna na mesma casa, todas devem ser tratadas ao mesmo tempo para evitar reinfeção.****SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR; NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.****- Quais são as possíveis reações adversas com o uso de MITICOÇAN®?**EM CRIANÇAS E PESSOAS DE PELE MUITO BRANCA E SENSÍVEL, O USO DE **MITICOÇAN® LÍQUIDO**, SEM DILUIÇÃO, E DE **MITICOÇAN® SABONETE** PODE PROVOCAR IRRITAÇÃO, QUE DESAPARECE COM A INTERRUPÇÃO DO USO. PODEM OCORRER, NO CASO DE INGESTÃO ACIDENTAL DO PRODUTO, AGITAÇÃO, VERTIGEM, DOR DE CABEÇA, NÁUSEAS, VÔMITOS, DIARRÉIA, FALTA DE AR, COLORAÇÃO AZULADA DA PELE, CIRCULAÇÃO DO SANGUE PREJUDICADA, ALERGIAS E VERMELHIDÃO DA PELE, PALPITAÇÃO E CONVULSÕES. É MUITO IMPORTANTE QUE VOCÊ INFORME AO MÉDICO, CASO OCORRAM REAÇÕES DESAGRADÁVEIS COM O USO DO PRODUTO.**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS****- Que cuidados devem ser tomados ao utilizar MITICOÇAN®?****MITICOÇAN® destina-se ao uso externo, não devendo, portanto, nunca ser ingerido, pois poderá ocorrer intoxicação.****MITICOÇAN®** não deve ser aplicado no rosto, olhos e mucosas, nem em locais da pele onde haja feridas. Caso isso ocorra, lavar com água abundantemente.

O produto deve ser utilizado com cautela em pessoas que já apresentaram alergias a outros produtos de aplicação na pele.

O uso em gestantes requer cuidados e observação rigorosa.

MITICOÇAN® pode irritar a pele e mucosas, não sendo recomendado o uso de outras substâncias que também possam irritar a pele.**- Quando MITICOÇAN® não deve ser utilizado?****MITICOÇAN®** não deve ser utilizado em casos de alergia conhecida ao benzoato de benzila ou aos outros componentes do produto.

Não aplicar o produto em lesões da pele, feridas e queimaduras.

- Em caso de ingestão acidental do produto, que providências tomar?

Podem ocorrer, no caso de ingestão acidental do produto, agitação, vertigem, dor de cabeça, náusea, vômitos, diarreia, falta de ar, coloração azulada da pele, circulação do sangue prejudicada, alergias e vermelhidão da pele, palpitação e convulsões.

Em caso de ingestão acidental do produto, entre imediatamente em contato com seu médico ou procure um pronto-socorro, informando a quantidade exata ingerida do produto, horário da ingestão e os sintomas.

NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE.**INFORMAÇÕES TÉCNICAS:**

210 mm

150 mm

CARACTERÍSTICAS:

O benzoato de benzila é utilizado eficazmente no tratamento da escabiose e pediculose. Seu efeito rápido e seguro faz com que desapareçam prontamente todos os sintomas, inclusive o prurido, permitindo a cura na quase totalidade dos casos, com um único tratamento. A trolamina, bem como a espuma do sabonete, garante perfeita penetração cutânea, facilitando o acesso aos túneis intradérmicos dos parasitas. As formas de apresentação de **MITICOÇAN®** não são oleosas, possuem cheiro aromático e normalmente, não irritam ou ressecam a pele.

INDICAÇÕES:

No tratamento da pediculose (piolhos e lêndeas) e escabiose (sarna).

CONTRA-INDICAÇÕES:

PESSOAS HIPERSENSÍVEIS AO BENZOATO DE BENZILA E DEMAIS COMPONENTES DA FORMULAÇÃO. LESÕES DA PELE, FERIDAS E QUEIMADURAS OU CONDIÇÕES DA PELE QUE POSSIBILITEM MAIOR ABSORÇÃO.

USO NA GRAVIDEZ E LACTAÇÃO:

O uso em gestantes requer cuidados e observação rigorosa, principalmente apresentando lesões ulceradas na pele.

ADVERTÊNCIAS:

MITICOÇAN® DESTINA-SE AO USO EXTERNO, NÃO DEVENDO, PORTANTO, SER INGERIDO, POIS PODERÁ OCORRER INTOXICAÇÃO.

MITICOÇAN® NÃO DEVE SER UTILIZADO NO ROSTO, OLHOS E MUCOSAS, NEM EM LOCAIS DA PELE ONDE HAJA FERIDAS. CASO ISSO OCORRA, LAVAR COM ÁGUA ABUNDANTEMENTE.

O PRODUTO DEVE SER UTILIZADO COM CAUTELA EM PESSOAS QUE JÁ APRESENTARAM ALERGIAS A OUTROS PRODUTOS DE APLICAÇÃO NA PELE.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

MITICOÇAN® pode irritar a pele e mucosas, não sendo recomendado o uso de outras substâncias que também tenham ação irritativa ou lesiva sobre a pele (como o ácido salicílico, hidroquinona, etc.), pois poderá ocorrer uma potencialização do efeito lesivo.

REAÇÕES ADVERSAS:

OCASIONALMENTE PODERÃO OCORRER IRRITAÇÕES LOCAIS COM A UTILIZAÇÃO DE **MITICOÇAN®**. CASO ESTAS REAÇÕES SE DESENVOLVAM EM LESÕES DO TIPO ALÉRGICA, O EMPREGO DO PRODUTO DEVERÁ SER SUSPENSO. SE HOVER MAIOR ABSORÇÃO DO QUE A DESEJADA, É POSSÍVEL OCORRER VERTIGEM, DOR DE CABEÇA, NÁUSEAS, VÔMITOS, DIARRÉIAS, CONVULSÕES, DISPNEIA, CIANOSE, COLAPSO CIRCULATÓRIO E REAÇÕES CUTÂNEAS ERITEMATOSAS.

POSOLOGIA:

Agite bem antes de usar.

MITICOÇAN® LÍQUIDO: para crianças até dois anos, aconselha-se a diluição do produto na proporção de 1 parte do produto para 2 partes de água. Crianças maiores de dois anos e menores de 12 anos, aconselha-se a diluição de 1 parte do produto para 1 de água.

Esta orientação visa a redução do risco de irritação. Para adultos, não é necessária a diluição. Não é necessário utilizar todo o volume em uma única aplicação. Adicionalmente, aconselha-se a fazer uma prova de toque em uma pequena área antes de utilizar o produto. Caso ocorra ardência ou vermelhidão, o produto não deverá ser utilizado.

Tratamento da pediculose: após lavar os cabelos, friccionar o produto sobre as regiões afetadas. Aplicar somente o suficiente para umedecer o cabelo. Envolver a cabeça com toalha e deixar agir por aproximadamente 3 minutos. Os piolhos mortos e as lêndeas devem ser retirados com um pente fino.

Se necessário, a aplicação deve ser repetida. Normalmente o tratamento só deve durar dois dias, pois várias aplicações do produto podem passar a ter papel irritante e perpetuador das lesões, ao invés de curativo.

Tratamento da escabiose: deve-se fazer uma aplicação, de preferência à noite, após o banho (banhos quentes são contraindicados). O produto deve ser aplicado sobre a pele ainda úmida, especialmente nos locais onde a sarna é mais comum (regiões interdigitais, axilas, abdômen e nádegas). Deixar secar, realizar em seguida uma nova aplicação e, vestir-se ou deitar-se sem enxugar o corpo. Na manhã seguinte, tomar novo banho e mudar as roupas do corpo e da cama, que devem ser lavadas e passadas em seguida. Se necessário, o tratamento deve ser repetido após 24 horas, ou conforme orientação médica.

MITICOÇAN® SABONETE: no tratamento de pediculose: deve-se lavar o local afetado com o sabonete, produzindo espuma que deverá permanecer no local por 5 minutos.

Os parasitas devem ser retirados com um pente fino. Se necessário, a aplicação deve ser repetida. No tratamento da escabiose: deve-se lavar cuidadosamente a parte afetada com o sabonete, produzindo uma espuma que deverá permanecer na pele até secar.

Se houver outras pessoas com escabiose na mesma casa, todas devem ser tratadas ao mesmo tempo para evitar reinfecção.

SUPERDOSAGEM:

Quando corretamente utilizado, inexistente o quadro de intoxicação por superdosagem com **MITICOÇAN®**, entretanto, se ingerido, o benzoato de benzila pode ocasionar estimulação do sistema nervoso central, com aparecimento de quadro clínico de agitação, vertigem, dor de cabeça, náuseas, vômitos, diarreia, falta de ar, coloração azulada da pele, circulação do sangue prejudicada, alergias e vermelhidão da pele, palpitação e convulsões.

Tratamento do quadro de intoxicação: indução de êmese e lavagem gástrica são os procedimentos indicados; a administração de anticonvulsivantes poderá ser indicada.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR; NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

Número de lote, data de fabricação e prazo de validade: vide cartucho.

MS - 1.0573.0334

Farmacêutico Responsável: Dr. Wilson R. Farias
CRF-SP nº 9555

SOLUÇÃO TÓPICA:

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.

Via Dutra, km 222,2
Guarulhos - São Paulo
CNPJ 60.659.463/0001-91
Indústria Brasileira

SABONETE:**Fabricado por:**

Indústria e Comércio Zambon Bernardi Ltda.

São Paulo - SP

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.

Via Dutra, km 222,2
Guarulhos - São Paulo
CNPJ 60.659.463/0001-91
Indústria Brasileira

