



CONTRA-INDICAÇÕES
OUIDONAL® É CONTRA-INDICADO PARA O TRATAMENTO DE INFECÇÕES VIRÓTICAS OU CAUSADAS POR FUNGOS. PACIENTES COM PERFURAÇÃO DA MEMBRANA TÍMPÂNICA OU PORTADORES DE HIPERSENSIBILIDADE A QUALQUER UM DOS COMPONENTES DA FÓRMULA.

PRECAUÇÕES

Para o tratamento de infecções profundas devem ser usados antibióticos sistêmicos adequados. Ouidonal® não é recomendado durante as duas primeiras semanas de vida, durante a gravidez ou lactação. O uso de antibióticos por tempo prolongado, pode facilitar a proliferação de microrganismos não sensíveis, incluindo fungos. Como existem riscos de toxicidade, o medicamento não deve ser utilizado em infecções banais, não definidas ou que possam ser tratadas com outros antibacterianos. Existe a possibilidade de ototoxicidade se o medicamento entrar em contato com o ouvido médio. A posologia determinada pelo médico deve ser seguida corretamente, devido ao cloridrato de lidocaína, que é um anestésico local, pois se a dose for excedida pode causar redução da audição; a qualquer observação neste sentido, deve-se interromper imediatamente o uso e consultar o médico.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

O uso de Ouidonal® simultaneamente a produtos que contenham penicilina e trimetoprima pode diminuir o efeito terapêutico do mesmo.

REAÇÕES ADVERSAS

As mais comuns são sinais de irritação local, com prurido e sensação de queimação; raramente podem ocorrer reações de hipersensibilidade como erupção cutânea, urticária, dermatite vesicular e máculo-papular. Como efeito sistêmico, podem ocorrer discrasias sanguíneas.

POSOLOGIA

* Adultos: instilar 2 a 3 gotas no ouvido externo afetado 3 ou 4 vezes ao dia.
 * Crianças: instilar 1 a 2 gotas no ouvido externo afetado até 3 vezes ao dia.
 A posologia adequada e a duração do tratamento devem ser ajustadas pelo médico de acordo com cada quadro clínico.

SUPERDOSE

Nestes casos o tratamento deve ser interrompido imediatamente e o médico avisado para a instituição da terapêutica adequada.

PACIENTES IDOSOS

O uso em pacientes idosos (acima de 60 anos) requer prescrição e acompanhamento médico.

Registro M.S. nº 1.0465.0051
 Farm. Responsável: Dr. Marco Aurélio Limirio G. Filho - CRF-GO nº 3.524
 Nº do lote, data de fabricação e prazo de validade: **VIDE CARTUCHO**

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Prezado Cliente:
 Você acaba de receber um produto **Neo Química**.
 Em caso de alguma dúvida quanto ao produto, lote, data de fabricação,
 ligue para nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor.



0800 97 99 900

PRODUZIDO POR:
NeoLatina Comércio e Indústria Farmacêutica Ltda.
 VPR-3 - Quadra 2-A - Módulos 20/21 - DAIA - CEP 75133-600 - Anápolis - GO



Laboratório Neo Química Com. e Ind. Ltda.
 VPR 1 - Quadra 2-A - Módulo 4 - DAIA - Anápolis - GO - CEP 75132-020
 www.neoquimica.com.br
 C.N.P.J.: 29.785.870/0001-03 - Indústria Brasileira


 33 - 00101
 3007273 - 06/2008

Ouidonal®

**cloranfenicol
 cloridrato de lidocaína**

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Solução Otológica: Embalagem contendo frasco com 10 mL.



USO ADULTO E PEDIÁTRICO

USO OTOLÓGICO

COMPOSIÇÃO

Cada mL contém:
 cloranfenicol25 mg
 cloridrato de lidocaína.....30 mg
 veículo q.s.p.....1mL
 (cloreto de benzalcônio, propilenoglicol, edetato dissódico, fosfato de sódio dibásico e água purificada).

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

- Ouidonal® é indicado para combater as infecções de ouvido e para aliviar a dor.
- Conservar em temperatura ambiente (15° a 30° C). Proteger da luz.
- Prazo de validade: **VIDE CARTUCHO**. Não use medicamento com o prazo de validade vencido; poderá ocorrer diminuição significativa do seu efeito terapêutico.
- "Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término". "Informe seu médico se está amamentando".
- "Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento".
- "Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico".
- "Informe seu médico a ocorrência de reações desagradáveis, tais como: irritação no local de aplicação com prurido ou sensação de queimação, formação de feridas, febre e diminuição da capacidade de audição".
- **"TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS"**.
- O uso de Ouidonal® simultaneamente a produtos que contenham penicilina e trimetoprima pode diminuir o efeito terapêutico do mesmo.
- Ouidonal® é contra-indicado para pacientes sensíveis a qualquer um dos componentes da fórmula e com perfuração do tímpano.
- Ouidonal® é de uso exclusivo no ouvido, não devendo ser usado pelas vias oral, nasal e ocular.
- Para manter a qualidade do produto, recomenda-se não tocar o conta-gotas do frasco e fechá-lo imediatamente após o uso.
- "Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando antes do início ou durante o tratamento".
- **"NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE"**.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

O cloranfenicol possui um espectro de ação antimicrobiana bastante amplo, atuando basicamente como bacteriostático contra várias bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, Riquetsias, Clamídias, Espiroquetas e Micoplasmas. Atravessa a membrana da célula bacteriana e se liga reversivelmente à subunidade 50 S dos ribossomos bacterianos, impedindo assim a transferência de aminoácidos às cadeias peptídicas crescentes; isso impede a formação da ligação peptídica e consequentemente a biossíntese proteica, o que acarreta o efeito antibacteriano. O cloridrato de lidocaína é um anestésico local, que é rapidamente absorvido (início de ação de 2 a 5 minutos) e que provoca alívio imediato dos sintomas dolorosos.

INDICAÇÕES

Ouidonal® é indicado para o tratamento tópico dos processos infecciosos do ouvido externo, causados por microrganismos sensíveis ao cloranfenicol.

