

**MODELO DE ROTULAGEM**  
**ESCABIN**  
**SABONETE / LOÇÃO / SHAMPOO**  
(Bula)

**Escabin**

deltametrina

**Formas Farmacêuticas e Apresentações:**

Loção. Cartucho contendo frasco com 100 mL

Shampoo. Cartucho contendo frasco com 100 mL

Sabonete. Cartucho contendo 1 sabonete com 70 g

**USO ADULTO E PEDIÁTRICO**

**USO EXTERNO**

**COMPOSIÇÃO:**

**Loção:** cada mL contém:

deltametrina (DCB 2748) ..... 0,2 mg

veículo\* q.s.p. .... 1,0 ml

\* cera emulsificante, estearato de octila, ácido cítrico anidro, metilparabeno, propilparabeno, glicerina, simeticona, hidroxietilcelulose, DMDM hidantoína e água de osmose reversa.

**Shampoo:** cada mL contém:

deltametrina (DCB 2748) ..... 0,2 mg

veículo\* q.s.p. .... 1,0 ml

\* dietanolamida ácido graxo de coco, ácido cítrico, lauril éter sulfato de sódio, lanolina etoxilada, cloreto de sódio, DMDM hidantoína e água de osmose reversa.

**Sabonete:** cada g contém:

deltametrina (DCB 2748) ..... 0,3 mg

excipiente\* q.s.p. .... 1,0 g

\* butilhidroxitolueno, lanette SY, essência de feno e massa base.

**INFORMAÇÕES AO PACIENTE**

**Ação esperada do medicamento:** a deltametrina atua como pediculicida e escabicida. Os sinais de melhora nos sintomas podem ocorrer em um prazo variável de dias, após o início do tratamento. Seu médico é a pessoa adequada para dar-lhe mais informações sobre o tratamento; siga sempre suas orientações. Não devem ser utilizadas doses superiores às recomendadas.

**Cuidados de armazenamento:** **Loção/Shampoo** - evitar calor excessivo (temperatura superior a 40°C) e proteger da luz e da umidade. **Sabonete** - evitar calor excessivo (temperatura superior a 40°C) e proteger da luz.

**Prazo de validade:** 24 meses a partir da data de fabricação.

Ao comprar qualquer medicamento, verifique o prazo de validade.

**Atenção:** não use medicamento com prazo de validade vencido. Além de não obter o efeito desejado, você poderá prejudicar sua saúde. Antes de usar observe o aspecto do medicamento.

“SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS  
PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA”.

**Gravidez e lactação:** informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe seu médico se está amamentando. Desconhecem-se efeitos adversos pelo uso do produto na gravidez ou lactação. Contudo, deve-se considerar o risco-benefício antes da indicação.

**Cuidados de administração:** siga sempre a orientação do seu médico, respeitando os horários, as doses e duração do tratamento. A administração conjunta do produto com outros medicamentos só deverá ser realizada após consulta do médico assistente. O uso em crianças e gestantes deve obedecer a cuidados e observações rigorosos. Escabin Loção deverá ser usado somente no corpo, para os cabelos e couro cabeludo usar Escabin Shampoo.

Não usar o produto para sobrancelhas ou cílios. No caso de contato com os olhos, lavá-los por 15 minutos com água corrente e procurar orientação médica. O produto deverá ser aplicado em local ventilado. Evitar contaminação de alimentos pelo produto. Não reutilizar o recipiente vazio.

**Como normas de higiene é recomendado:**

1. Ferver as roupas de cama e de uso pessoal, mantendo-as limpas.
2. Manter as unhas curtas e limpas. No caso de pediculose (piolhos) e ftríase (chatos), manter os cabelos curtos e limpos.
3. Evitar exagero de coçar, e colocar luvas de proteção nas crianças.
4. Procurar descobrir possíveis portadores e possíveis contatos com eles ou seus objetos de uso.
5. Alertar os responsáveis por instituições coletivas freqüentadas pelo portador do parasita.

**Interrupção do tratamento:** não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico. A interrupção repentina deste medicamento não causa efeitos desagradáveis, nem riscos, apenas cessará o efeito terapêutico.

**REAÇÕES ADVERSAS:** EM ALGUNS CASOS, O PRODUTO PODE PRODUZIR, TRANSITÓRIAS NA MAIORIA DAS VEZES, ALGUMAS REAÇÕES DESAGRADÁVEIS. INFORME SEU MÉDICO O APARECIMENTO DE REAÇÕES DESAGRADÁVEIS.

**“TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS”.**

**CONTRA-INDICAÇÕES:** O PRODUTO É CONTRA INDICADO PARA PACIENTES QUE APRESENTAREM ANTECEDENTES DE HIPERSENSIBILIDADE A QUALQUER UM DOS COMPONENTES DA FÓRMULA. INFORME A SEU MÉDICO SOBRE QUALQUER MEDICAMENTO QUE ESTEJA USANDO, ANTES DO INÍCIO, OU DURANTE O TRATAMENTO.

**Precauções:** ESTE MEDICAMENTO PODE SER UTILIZADO DURANTE A GRAVIDEZ DESDE QUE SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.

“INFORME AO SEU MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA O APARECIMENTO DE REAÇÕES INDESEJÁVEIS”.

“INFORME AO SEU MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA SE VOCÊ ESTA FAZENDO USO DE ALGUM OUTRO MEDICAMENTO”.

**“NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE”.**

## **INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

**Características químicas e farmacológicas:** a deltametrina é a substância mais ativa da classe dos piretróides, substância sintética obtida por esterificação do ácido crisantêmico. A deltametrina apresenta elevado coeficiente de segurança e baixa toxicidade para mamíferos. Possui considerável efeito residual e alto poder letal contra piolhos e ácaros. A deltametrina apresenta notáveis propriedades pediculicidas e escabicidas, sendo o *Pediculis humanus capitis*, *Pediculus humanus humanus*, *Phthirus púbis* e seus ovos extraordinariamente sensíveis à sua ação. A sua ação é seletiva e se dá após absorção da substância através

do exoesqueleto de quitina dos ectoparasitas. Uma vez no interior do organismo do inseto, a deltametrina transportada pela hemolinfa, fixa-se nos gânglios nervosos periféricos e nas estruturas motoras do sistema nervoso central, produzindo excitabilidade, incoordenação motora, paralisia, letargia e morte do parasita.

**Indicações:** o produto está indicado no tratamento e profilaxia da pediculose (piolhos), da ftiíase (chatos), da escabiose (sarna) e das infestações por carrapatos em geral.

**CONTRA-INDICAÇÕES:** HIPERSENSIBILIDADE À DELTAMETRINA, ALERGIA RESPIRATÓRIA E LESÕES DE PELE: FERIDAS E QUEIMADURAS OU CONDIÇÕES QUE POSSIBILITEM MAIOR ABSORÇÃO.

**PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:** O MEDICAMENTO ESTÁ INDICADO SOMENTE PARA USO TÓPICO. NÃO DEVE SER INGERIDO OU INALADO. DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DOS OLHOS E MUCOSAS. NO CASO DE CONTATO ACIDENTAL COM OS OLHOS, LAVÁ-LOS IMEDIATAMENTE COM ÁGUA CORRENTE POR ALGUNS MINUTOS. NO CASO DE INFECÇÃO OU IRRITAÇÃO DA PELE, INTERROMPER O TRATAMENTO.

**INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:** AINDA NÃO FORAM TOTALMENTE RELACIONADAS AS INTERAÇÕES DO PRODUTO COM OUTRAS DROGAS E/OU MEDICAMENTOS.

**REAÇÕES ADVERSAS E EFEITOS COLATERAIS:** PODEM OCORRER IRRITAÇÃO CUTÂNEA, OCULAR E REAÇÕES DE HIPERSENSIBILIDADE, SOBRETUDO DO TIPO ALERGIA RESPIRATÓRIA. NO CASO DE USO EM PELE LESADA POR FERIDAS OU QUEIMADURAS, PODEM OCORRER MAIOR ABSORÇÃO DA DELTAMETRINA COM EFEITOS GASTRINTESTINAIS E NEUROLÓGICOS AGUDOS.

#### **Posologia e modo de usar:**

**Loção:** friccionar em toda região afetada do corpo, caso necessário, deixando permanecer até o próximo banho. Usar durante 4 dias consecutivos.

**Shampoo:** deve ser aplicado nos cabelos e couro cabeludo, de preferência durante o banho, fazendo ligeiras fricções com a ponta dos dedos. Deixar nas áreas atingidas durante 5 minutos. Enxaguar bem. Usar durante 4 dias consecutivos.

**Sabonete:** ensaboar energicamente toda região afetada do corpo, caso necessário, deixando a espuma permanecer durante 5 minutos. Enxaguar bem. Usar durante 4 dias consecutivos.

O produto deve ser reaplicado após 7 dias, seguindo a posologia e modo de usar, para evitar uma possível re-infestação por permanência de ovos.

#### **Superdosagem:**

- No caso de ingestão acidental, o tratamento é principalmente de suporte.
- Deve-se induzir o vômito nos indivíduos conscientes ou realizar lavagem gástrica, nos inconscientes.
- Pode-se administrar sais catárticos para maior trânsito intestinal e menor absorção intestinal da piretrina.
- No caso de inalação acidental, pode-se necessitar de respiração artificial.

**Pacientes idosos:** não foram relatadas restrições quanto ao uso do produto em pacientes maiores de 65 anos de idade.

**“SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR; NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA”.**

**Venda sem prescrição médica.**

Número do lote, data de fabricação e prazo de validade: vide cartucho/rótulo.

Atendimento ao Consumidor: 080077 17017 (Ligação Gratuita)

Reg. MS 1.2283.0093

Farm. Resp.: Dr. Carlos Takashi Maki – CRF – SP n° 5606

**DM Indústria Farmacêutica Ltda.**

Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, 1000 - Barueri - SP

CNPJ n° 67.866.665/0002-34

Indústria Brasileira -Marca Registrada

**Sabonete** produzido por: **Indústria e Comércio Zambon Bernardi Ltda.**

Rua Toledo Barbosa, 666/690 – São Paulo – S.P.

Fab.: / Val.: / Lote: