

DACTIL

Drágeas

DACTIL provou ser o mais satisfatório de uma série de anticolinérgicos testados, por seu valor na prevenção de contrações uterinas prematuras. **DACTIL** é um derivado do piperidol que diminui os espasmos musculares, inibindo os impulsos nervosos pós-ganglionares parassimpáticos. Mostrou-se eficaz na prevenção do início do parto em casos onde à dilatação e (ou) estreitamento da cérvix. Se a paciente não tiver atingido o ponto próprio para o parto, **DACTIL** parece diminuir o espasmo do músculo uterino.

Indicações - DACTIL

Como auxiliar na prevenção de parto prematuro.

Fórmula e apresentação - DACTIL

Cada drágea contém: Cloridrato de piperidolato 100 mg; Hesperidina (complexo) 50 mg; Ácido ascórbico 50 mg; Excipiente q.s.p. 1 drágea; Caixa com 30 drágeas.

Posologia e modo de usar - DACTIL

Usualmente, uma drágea 4 vezes ao dia, dependendo da resposta do paciente. A terapia deve começar tão cedo o diagnóstico de um possível parto prematuro seja feito. Medidas adicionais, terapia hormonal, sedação e administração de antibióticos devem ser utilizadas, se forem necessárias. O tratamento deve ser continuado até a trigésima nona semana de gestação ou até o parto.

Contra-indicações - DACTIL

Não se observou contra-indicações ao uso de **DACTIL-OB**. Como todas as drogas com ação anticolinérgica, todavia, **DACTIL-OB** não deve ser usado em pacientes com glaucoma.

HOECHST MARION ROUSSEL S/A.