

**GLYTEOL**<sup>®</sup>  
XPE  
guaifenesina 13,33 mg/ml  
HERTZ<sup>®</sup>

**FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES**  
**Glyteol XPE xarope sabor morango:** frascos vidro âmbar contendo 100 ml de xarope.  
**Glyteol XPE xarope:** frascos vidro âmbar contendo 100 ou 150 ml de xarope.

#### USO ORAL

#### USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 6 ANOS

#### COMPOSIÇÃO

**Cada 15 ml de Glyteol XPE xarope sabor morango contém:** guaifenesina 200 mg. Veículos: sacarose, propileno glicol, sorbitol, sacarina sódica, metilparabeno, propilparabeno, corante bordeaux, ácido cítrico, aroma de morango, mentol, água deionizada.

**Cada 15 ml de Glyteol XPE xarope contém:** guaifenesina 200 mg. Veículos: sacarose, álcool etílico (2%), sorbitol, sacarina sódica, aroma de baunilha, metilparabeno, propilparabeno, corante bordeaux, ácido cítrico, aroma de morango, mentol, água deionizada.

Ambos contêm 400 mg de açúcar (sacarose) por ml.

#### INFORMAÇÕES AO PACIENTE

**Ação esperada do medicamento:** expectorante.

**Cuidados de armazenamento:** Conservar em temperatura ambiente (15 a 30°C). Proteger da luz e da umidade.

**Prazo de validade:** Observada a correta forma de armazenagem, a validade é de 24 meses, a partir da data de fabricação. Não use medicamento com o prazo de validade vencido, pois pode ser prejudicial à sua saúde. Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Vide cartucho.

**Gravidez e Lactação:** Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou

após o seu término. Informar ao médico se está amamentando.

**Cuidados de administração:** Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração de tratamento.

**Interrupção do tratamento:** Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

**Reações adversas:** Pouco frequentes ou raras: Náuseas, vômitos, diarreia, erupção cutânea, dor de estômago, dor de cabeça, sonolência e vertigem. Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.

#### TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

**Contra-indicações:** Hipersensibilidade à guaifenesina ou a qualquer outro componente do produto. Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

**Precauções e advertências:** Não tome este medicamento em caso de tosse crônica como a causada por asma, fumo, bronquite crônica ou enfisema, ou se a tosse vier acompanhada de muco excessivo, a menos que indicado por um médico. Não exceda a dose recomendada. Não utilize por mais de 5 dias. Consulte seu médico se a tosse persistir por mais de 5 dias, tender a reincidir, vier acompanhada de febre, erupções cutâneas, dor de garganta ou dor de cabeça persistente; em caso de gravidez ou lactação. Se os sintomas não melhorarem, consulte seu médico. É importante tomar bastante quantidade de líquidos durante o tratamento. Não deve ser administrado em crianças com menos de 6 anos de idade, a menos que indicado pelo médico. Glyteol XPE xarope contém álcool. Conservar o produto ao abrigo do calor, luz e umidade.

**Atenção diabéticos: contém açúcar.**

**Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica.**

**Aspecto físico:** Líquido límpido de coloração bordô com odor e sabor morango ou morango e baunilha mentolados.

261107

**Superdosagem:** Em caso de superdosagem acidental, procure auxílio médico imediatamente.

#### NÃO TOMAR REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DE SEU MÉDICO, PODE SER PREJUDICIAL A SUA SAÚDE.

#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

guaifenesina é um expectorante, indicado para o alívio sintomático de condições respiratórias, pois facilita a eliminação do muco, ao reduzir sua viscosidade, modificando a tosse improdutiva e seca na tosse produtiva e menos freqüente. Trata-se de um expectorante cuja ação aumenta a produção e reduz a adesão e a tensão superficial do muco no trato respiratório. O aumento do fluxo ou a diminuição da viscosidade promove uma ação ciliar e facilita a remoção do muco. A guaifenesina é totalmente absorvida no trato gastrointestinal, é metabolizada e excretada na urina. Para auxiliar a fluidificação e a expulsão do muco pulmonar, o paciente deve ingerir água após cada dose. A duração do tratamento deve ser a menor possível.

#### INDICAÇÕES

Glyteol XPE xarope é indicado como expectorante.

**Contra-indicações:** Hipersensibilidade à guaifenesina ou a qualquer outro componente do produto.

**Precauções e advertências:** Não é indicado em caso de tosse crônica como a causada por asma, fumo, bronquite crônica ou enfisema, ou se a tosse vier acompanhada de muco excessivo, a menos que indicado por um médico. Não é aconselhado o uso por mais de 5 dias. O médico deve ser consultado se a tosse persistir por mais de 5 dias, tender a reincidir, vier acompanhada de febre, erupções cutâneas, dor de garganta ou dor de cabeça persistente; em caso de gravidez ou lactação. É importante que o paciente ingira bastante quantidade de líquidos durante o tratamento para facilitar a expectoração. Não deve ser administrado em crianças com menos de 6 anos de idade, a menos que indicado pelo médico. Glyteol XPE xarope contém álcool.

**Gravidez e Lactação:** A utilização deste medicamento durante a gravidez e a lactação exigem avaliação Risco x Benefício. Não há estudos adequados em mulheres. O benefício potencial do produto pode justificar o risco potencial durante a

gravidez. Risco na gravidez (FDA): categoria C.

**Atenção diabéticos: contém açúcar.**

#### Interações medicamentosas

guaifenesina pode interferir nas análises do ácido 5-hidroxiindolacético e ácido vanililmandélico. A determinação da concentração urinária do ácido 5-hidroxiindolacético com o reagente nitros-naftol causa interferência devido a cor da guaifenesina; os metabólitos do expectorante podem interferir na determinação colorimétrica do ácido vanililmandélico urinário; a agregação plaquetária permanece diminuída temporariamente sem alterar o tempo de sangramento.

**Reações adversas:** Pouco frequentes ou raras: Náuseas, vômitos, diarreia, erupção cutânea, dor de estômago, dor de cabeça, sonolência e vertigem.

#### POSOLOGIA

##### USO ORAL

**Adultos e crianças maiores de 12 anos:** 15 ml a cada 4 horas.

**Crianças de 6 a 12 anos:** 10 ml a cada 4 horas.  
**Crianças abaixo de 6 anos:** somente em caso de recomendação médica.

Não exceder 6 doses ao dia.

Em caso de esquecimento de uma dose, tomar tão logo possível a menos que esteja perto da próxima dose. Não tomar dose dupla.

**Superdosagem:** Em caso de superdosagem acidental, considerar as medidas padrões de atendimento.

**Pacientes idosos:** Não existem recomendações especiais ou precauções especiais sobre o uso do produto por pacientes idosos.

#### VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA.



**SAC 0800 7049001**  
[www.kleyhertz.com.br](http://www.kleyhertz.com.br)

**KLEY HERTZ S.A. Indústria e Comércio**  
Rua Comendador Azevedo, 224 - Porto Alegre - RS  
Farmacêutica Responsável: Paula Carniel Antonio  
CRF-RS 4228 - Reg. no M.S. nº 1.0689.0159  
C.N.P.J. nº 92.695.691/0001-03 - Indústria Brasileira

261107