

**MYDRIACYL®**  
tropicamida 1%

Solução Oftálmica Estétil

**USO ADULTO E PEDIÁTRICO**

**APRESENTAÇÃO:**

Frascos plásticos conta-gotas contendo 5 ml.

**COMPOSIÇÃO:**

Cada ml contém:

Tropicamida.....0,01g

Veículo constituído de cloreto de sódio, com edetato dissódico e cloreto de benzalcônio como conservantes e água destilada q.s.p 1 ml

**INFORMAÇÃO AO PACIENTE:**

O produto deve ser conservado em temperatura ambiente e protegido da luz.

Para evitar contaminação não toque o conta-gotas. Tampe bem o frasco após o uso.

O prazo de validade está gravado na embalagem do medicamento. Não use medicamento com prazo de validade vencido.

Informe o médico sobre a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe o médico se está amamentando.

Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Informe o seu médico o aparecimento de reações desagradáveis. Podem ocorrer desconforto local, boca seca, visão borrada, sensibilidade à luz, taquicardia, cefaléia.

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

Uso concomitante com outras substâncias: Siga a orientação do seu médico.

Contra-indicações: Hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Pacientes com glaucoma primário ou com propensão ao glaucoma.

Enquanto estiver com a pupila dilatada o paciente não deve dirigir veículos ou operar máquinas, pois a sua habilidade e atenção podem estar prejudicadas.

**NÃO USE REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE.**

**INFORMAÇÃO TÉCNICA:**

**DESCRIÇÃO:**

MYDRIACYL Solução Oftálmica Estétil é uma solução de tropicamida 1%, estétil para uso tópicu oftálmico.

**MECANISMO DE AÇÃO:**

A tropicamida é um agente anticolinérgico que bloqueia as respostas do músculo esfíncter da íris e do músculo ciliar à estimulação colinérgica, dilatando a pupila (midríase) e paralisando a acomodação (cicloplegia). MYDRIACYL age rapidamente e a duração de sua atividade é relativamente curta.

#### **INDICAÇÕES:**

MYDRIACYL é indicado como midriático e cicloplégico.

#### **CONTRA-INDICAÇÕES:**

MYDRIACYL está contra-indicado em pacientes com glaucoma primário ou com propensão ao glaucoma (ângulo da câmara anterior estreito) e em pacientes que demonstrem hipersensibilidade aos componentes do produto.

#### **PRECAUÇÕES:**

Deve-se tomar cuidado quando a pressão intra-ocular é alta ou desconhecida e quando a câmara anterior é rasa. Os midriáticos e cicloplégicos devem ser usados com muita cautela em pessoas idosas, ou outras de qualquer idade, que tenham potencial para um aumento na pressão intra-ocular. Deve-se proceder a um exame do ângulo da câmara anterior a fim de evitar uma crise de glaucoma de ângulo fechado. Deve-se também comprimir o saco lacrimal por dois ou três minutos logo após a instilação para evitar uma absorção sistêmica excessiva.

#### **ADVERTÊNCIAS:**

MYDRIACYL é indicado unicamente para uso tópico, não devendo ser injetado. Até o presente não foram efetuados estudos relativos à reprodução em animais, bem como não se dispõe de informações concretas quanto aos possíveis efeitos desta droga sobre a fertilidade humana tanto masculina como feminina ou se a mesma possui algum efeito teratogênico potencial ou outras reações indesejáveis sobre o feto. Esta preparação poderá causar distúrbios do SNC, que poderão ser perigosos para as crianças, inclusive as de tenra idade. Deve-se ter sempre em mente a possibilidade de ocorrência de reações psicóticas e distúrbios de comportamento devidos à hipersensibilidade a drogas anticolinérgicas.

#### **REAÇÕES ADVERSAS:**

Aumento da pressão intra-ocular. Reações psicóticas e distúrbios do comportamento, colapso cárdio-respiratório em crianças e em alguns adultos foram relatados com o uso de drogas desta classe. Outros sintomas como: ardor passageiro, boca seca, visão borrada, fotofobia com ou sem coloração corneana, taquicardia, cefaléia, estimulações parassimpáticas ou reações alérgicas também podem ocorrer.

#### **POSOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO:**

Instilar 1 ou 2 gotas de Mydriacyl 1 %. Decorridos 5 minutos, instilar mais 1 ou 2 gotas. Se o paciente não for atendido nos 20-30 minutos decorridos da primeira instilação, deve ser instilada uma gota adicional, a fim de prolongar os efeitos cicloplégico e midriático. Os pacientes com íris fortemente pigmentada podem precisar de doses maiores.

Lote, fabricação e validade: vide cartucho

MS 1.0023.0088

CONSERVE EM TEMPERATURA AMBIENTE. PROTEJA DA LUZ.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

ALCON LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.

Av. N. S. da Assunção, 736 05359-001 São Paulo SP

CNPJ 60.412.327/0013-36

Indústria Brasileira

Farm. Resp.: Lygia C. Piazza CRF-SP No. 8066

Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800-7077908

**Alcon**