

VITACID PLUS

Theraskin Farmacêutica Ltda.

Creme

hidroquinona 40mg/g, tretinoína 0,5mg/g, fluocinolona acetonida 0,1mg/g

VITACID[®] PLUS
hidroquinona
tretinoína
fluocinolona acetonaída

APRESENTAÇÕES

Creme para uso t3pico, contendo 40mg de hidroquinona, 0,5mg de tretinoína e 0,1mg de fluocinolona acetonaída por grama de produto. Bisnagas contendo 15g.

**USO DERMATOL3GICO.
USO ADULTO.**

COMPOSIÇÃO

Cada g do produto cont3m:

hidroquinona.....	40 mg
tretinoína.....	0,5 mg
fluocinolona acetonaída.....	0,1 mg
Excipiente.....	q.s.p. 1g

Excipiente: himidazolidinilur3ia, propilenoglicol, edetato diss3dico di-hidratado, cetil sulfato de s3dio, estearilsulfato de s3dio, butilhidroxianisol, butilhidroxitolueno, PPG-14, metilparabeno, propilparabeno, etilparabeno, butilparabeno, fenoxietanol, 3cido este3rico, polidimetilsiloxano, estearato de polietilenoglicol, glicer3deos mono-e di C14-18, polietilenoglicol, octametilciclotetrasiloxano, palmitato de polietilenoglicol, diestearato de polietilenoglicol, 3lcool cetoestear3fico, polissorbato 60, petrolato l3quido, metabissulfito de s3dio, fragr3ncia e 3gua

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Leia estas informa33es cuidadosamente antes de iniciar o tratamento e a cada vez que voc3 comprar o produto, pois pode haver informa33es novas. Consulte o seu m3dico se voc3 tiver outras d3vidas sobre a doen3a ou o produto. Somente o m3dico poder3 decidir se este medicamento 3 adequado para voc3.

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO 3 INDICADO?

Este medicamento 3 indicado para o tratamento de curta dura33o do melasma moderado a grave da face (escurecimento da pele do rosto, especialmente nas bochechas e na testa).

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Vitacid[®] Plus age clareando as manchas escuras do melasma. A melhora ocorre gradativamente com o decorrer do tratamento, e os primeiros resultados aparecem geralmente ap3s 4 semanas de tratamento.

3. QUANDO N3O DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

N3o use o produto se voc3 for al3rgico ao medicamento ou aos seus componentes.

Este medicamento 3 contraindicado para menores de 18 anos.

Este medicamento n3o deve ser utilizado por mulheres gr3vidas, sob suspeita de gravidez ou lactantes sem orienta33o m3dica.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Evite a exposi33o excessiva 3 luz solar natural ou artificial, pois as manchas podem ficar ainda mais escuras. Utilize filtro de prote33o solar com fator 30 (no m3nimo) e roupas protetoras, incluindo chap3u ao sair de casa.

Se voc3 tiver queimadura de sol, interrompa o uso de Vitacid[®] Plus at3 que a pele volte ao normal.

N3o use medicamento sem o conhecimento de seu m3dico. Pode ser perigoso para a sua sa3de.

N3o use o produto em excesso e n3o aplique com frequ3ncia maior que o recomendado pelo m3dico. Ele poder3 irritar a pele, e n3o dar3 resultados melhores ou mais r3pidos.

N3o cubra a 3rea ap3s a aplica33o de Vitacid[®] Plus creme.

Evite produtos que possam ressecar ou irritar a pele tais como: sabonetes e cosm3ticos contendo 3lcool, fragr3ncias ou certos shampoos e produtos para permanente dos cabelos.

Aten33o: N3o use este medicamento sem consultar seu m3dico, caso esteja gr3vida. Ele pode causar problemas ao feto.

Informe ao seu médico se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Mantenha o produto bem fechado, à temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C). Proteger da luz, do calor e da umidade.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o na sua embalagem original.

Vitacid[®] Plus é um creme de cor amarela e odor característico.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Lave o rosto com um higienizador suave (não use esponja). Enxágue e enxugue a pele.

Aplique Vitacid[®] Plus à noite, no mínimo 30 minutos antes de deitar.

Coloque uma pequena quantidade (aproximadamente o tamanho de uma ervilha) de Vitacid[®] Plus na ponta dos dedos. Aplique uma camada fina para cobrir as manchas e mais 0,5 centímetro de pele normal ao redor da mancha. Após algum tempo de tratamento, você poderá notar que vai precisar aplicar uma quantidade um pouco menor de medicação.

Espalhe o creme suavemente e de maneira uniforme. O creme deve "desaparecer" na pele quase imediatamente. Se isso não acontecer, significa que você aplicou produto em excesso.

Não aplique nos cantos do nariz, boca, olhos ou na pele machucada. Espalhe o produto sempre evitando estas áreas.

Se a pele tornar-se muito irritada, pare de usar o produto e consulte o médico.

Para ajudar a evitar o ressecamento, pode ser utilizado hidratante pela manhã, após lavar o rosto.

Cosméticos podem ser usados durante o dia, desde que não sejam comedogênicos ou irritantes.

Após o término do tratamento com Vitacid[®] Plus, continue a proteger a sua pele do sol. Se o melasma reaparecer, o tratamento poderá ser reiniciado, até que ocorra novamente o clareamento das manchas. O produto se mostrou seguro para uso intermitente (não-contínuo) durante até 6 meses.

Em caso de ingestão acidental, recomenda-se consultar o médico.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Se você se esquecer de aplicar o produto, volte a aplicar normalmente na noite seguinte, não sendo necessária uma aplicação extra.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

As seguintes reações adversas são relatadas com o uso do Vitacid[®] Plus creme: vermelhidão leve a moderada, descamação, ardência grave ou inchaço da pele, ressecamento ou prurido (coceira), irritação grave ou continuada da pele, bolhas, formação de crostas, irritação dos olhos, nariz e boca, manchas escuras na pele (hiperpigmentação), sensação de picada, aumento da sensibilidade da pele, erupções, acne, vermelhidão da pele, vesículas, linhas vermelhas finas ou vasos sanguíneos visíveis através da pele (telangiectasia).

Alguns pacientes alérgicos aos sulfitos podem apresentar reações alérgicas graves ao Vitacid[®] Plus, com reações que incluem problemas respiratórios ou ataques graves de asma.

As seguintes reações adversas locais foram relatadas de forma infrequente com outros corticosteróides tópicos, e podem ocorrer com maior frequência com o uso de curativos oclusivos, especialmente com corticosteróides de maior potência. Em ordem aproximada de ocorrência decrescente: hipopigmentação

(diminuição da produção de pigmentos da pele), dermatite perioral (erupções ao redor da boca), dermatite alérgica de contato (alergia), infecção secundária, estrias e miliária (erupção cutânea relacionada com as glândulas de suor).

Informe ao seu médico ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

O uso excessivo não trará resultados terapêuticos melhores ou mais rápidos, podendo ocorrer irritação da pele.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações

DIZERES LEGAIS

MS 1.0191.0295.001-2

Farm. Resp.: Dra. Rosa Maria Scavarelli

CRF-SP nº 6.015

THERASKIN FARMACÊUTICA LTDA.

Marg. Direita da Via Anchieta km 13,5

São Bernardo do Campo – SP

CEP 09696-005

CNPJ 61.517.397/0001-88

Indústria Brasileira

COT – Centro de Orientação Theraskin

0800 0196660

cot@theraskin.com.br

www.theraskin.com.br

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Atenção: Não use este medicamento sem consultar seu médico, caso esteja grávida. Ele pode causar problemas ao feto.

v.02



Histórico de Alteração para a Bula

Número do expediente	Nome do Assunto	Data da notificação / petição	Data da aprovação da petição	Itens Alterados
0976669/12-3	Notificação de alteração de texto de bula	03/12/2012	03/12/2012	Sobre a bula aprovada foi realizada: * Adequação de texto conforme o texto do medicamento referência;
0441776/13-3	Inclusão Inicial de Texto de Bula – RDC 60/12	04/06/2013	04/06/2013	Inclusão de frase de alerta devido a presença do ativo tretinoína; Correção do número de registro; Correção dos cuidados de conservação; Correção de erros ortográficos.