

Composição - ATROPINA

0,5% e 1% contém respectivamente: sulfato de atropina 5 mg e 10 mg, veículo q.s.p. 1 ml. Veículo basicamente constituído de ácido bórico, citrato de sódio, edetato dissódico, polissorbato 80 e cloreto de benzalcônio.

Posologia e Administração - ATROPINA

instilar no saco conjuntival uma a duas gotas do **colírio**, ou de acordo com o critério médico. O saco lacrimal deve ser comprimido por 1 ou 2 minutos, após a instilação do **colírio**, para reduzir ou evitar a absorção sistêmica da droga. - Superdosagem: perante a presença de **sinais** de intoxicação sistêmica (**ataxia, alucinação, incoerência verbal, hiperatividade, convulsão**) o paciente deverá ser encaminhado a um centro médico apropriado onde serão tomadas as condutas habituais para intoxicação muscarínica (atropínica). O uso da fisostigmina tem sido adotado para abolir o **delírio** e o **coma**. O diazepam, em doses controladas, poderá evitar a **convulsão** e sedar o paciente ansioso. Para controle da **febre**, principalmente em crianças, recomenda-se gelo e álcool em aplicação dérmica. O suporte artificial da respiração poderá ser necessário.

Precauções - ATROPINA

para evitar os efeitos sistêmicos, o **colírio** deverá ser instilado em dose e frequência menores conforme a resposta do paciente. A pressão intra-ocular deve ser medida em pacientes idosos antes da droga ser administrada.

Reações adversas - ATROPINA

os anticolinérgicos podem causar aumento abrupto da pressão intra-ocular em olhos com ângulos estreitos ou com câmaras anteriores achatadas, precipitando um ataque de **glaucoma** por fechamento de ângulo, bem como em casos de **glaucoma** primário de ângulo aberto. A absorção sistêmica da **Atropina** poderá resultar em efeitos sobre o sistema nervoso central (**ataxia, alucinação, incoerência verbal, hiperatividade, convulsão e febre**), principalmente em pacientes mais sensíveis (crianças e idosos). Podem ocorrer também **taquicardia, vasodilatação, retenção urinária** e decréscimo da secreção salivar. A **Atropina** ocasionalmente causa irritação local dos olhos e em pessoas susceptíveis pode produzir dilatação da pálpebra e **conjuntivite**. Com o uso contínuo da droga, a **conjuntivite** pode se tornar crônica.

Contra-Indicações - ATROPINA

nos casos de hipertensão do globo ocular e glaucoma.

Indicações - ATROPINA

para obtenção de midríase e cicloplegia.

Apresentação - ATROPINA

colírio apresentado em frasco plástico conta-gotas, hermeticamente fechado e estéril, com 5 ml.