Amlocor

Besilato de anlodipino

Composição - Cada comprimido de AMLOCOR 5 mg contém: Besilato de anlodipino 6,93 mg (equivalente a 5 mg de anlodipino base). Excipientes: Fosfato de cálcio dibásico anidro, celulose microcristalina, povidona (K-30), amido de milho glicolato, estearato de magnésio e talco. Cada comprimido de AMLOCOR 10 mg contém: Besilato de anlodipino 13,86 mg (equivalente a 10 mg de anlodipino base). Excipientes: Fosfato de cálcio dibásico anidro, celulose microcristalina, povidona (K-30), amido de milho glicolato, estearato de magnésio e talco.

Indicações - Tratamento da hipertensão podendo ser usado na maioria dos pacientes como agente único de controle da pressão sanguínea. Tratamento da isquemia miocárdica como droga de primeira linha, devido tanto à obstrução fixa (angina estável) como ao vasoespasm/vasoconstrição (angina de Prinzmetal ou angina variante) da vasculatura coronária.

Contraindicações - Hipersensibilidade conhecida ao anlodipino, às diidropiridinas.

Reações adversas - O anlodipino é bem tolerado. Os efeitos colaterais mais comumente observados foram: rubor, fadiga, edema, tontura e dor de cabeça, dor abdominal e náusea, palpitações, sonolência.

Posologia - Na hipertensão e na angina a dose inicial usual é de AMLOCOR (besilato de anlodipino) 5 mg uma vez ao dia, podendo ser aumentada para uma dose máxima de 10 mg.

Apresentações - AMLOCOR 5 mg: Embalagem contendo 30 comprimidos. AMLOCOR 10 mg: Embalagem contendo 30 comprimidos.

Registro no M.S. 1.0525.0008.

TORRENT do Brasil Ltda.